

## INFORMACJA DLA PACJENTA

### Ocena komórek NK CD57 w boreliozie:

- Do wykonania badania niezbędna jest morfologia krwi obwodowej. Należy zgłosić się z wynikiem wykonanej wcześniej, maksymalnie tygodniowej morfologii lub pobrać krew na miejscu. W takim przypadku należy zgłosić się rano na czczo, do godziny 10:00.
- Czas oczekiwania na wynik: do 5 dni roboczych od pobrania materiału.

### Ocena subpopulacji limfocytów krwi obwodowej (immunofenotyp):

- Do wykonania badania niezbędna jest morfologia krwi obwodowej. Należy zgłosić się z wynikiem wykonanej wcześniej, maksymalnie tygodniowej morfologii lub pobrać krew na miejscu. W takim przypadku należy zgłosić się rano na czczo, do godziny 10:30.
- W przypadku pacjentek, u których występują poronienia nawykowe bądź niepowodzenia IVF, zalecany czas wykonania badania jest druga faza cyklu, u pozostałych pacjentów nie ma to znaczenia.
- W przypadku przyjmowania silnych leków sterydowych, antybiotyków o działaniu ogólnoustrojowym, wystąpienia infekcji z podwyższoną temperaturą ciała badanie należy wykonać po 4 tygodniach od zakończenia leczenia bądź ustąpienia objawów choroby.
- Czas oczekiwania na wynik: do 5 dni roboczych od pobrania materiału.

### Fragmentacja DNA plemników:

- Zalecany okres abstynencji seksualnej to 2-5 dni, najlepiej 2-3 dni.
- W przypadku wystąpienia gorączki, infekcji (np. grypy, silnego przeziębienia) należy odczekać 4 tygodnie przed wykonaniem badania.
- Nie należy wykonywać badania w czasie przyjmowania leków takich jak: antybiotyki działające ogólnoustrojowo, silne leki sterydowe, duże ilości niesterydowych leków przeciwzapalnych. W takich przypadkach po zakończeniu leczenia należy odczekać 4 tygodnie przed przystąpieniem do badania.
- Czas oczekiwania na wynik: do 10 dni roboczych od pobrania materiału.